

Alameda County Behavioral Health Care Services

ក្រដាសផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថ្នាំពេទ្យ: ថ្នាំបំបាត់ការកង្វល់ចិត្ត/ថ្នាំធ្វើឲ្យដេកលក់/

antianxiety/hypnotic agents

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> alprazolam (Xanax) | <input type="checkbox"/> lorazepam (Ativan) |
| <input type="checkbox"/> chlordiazepoxide (Librium) | <input type="checkbox"/> oxazepam (Serax) |
| <input type="checkbox"/> clonazepam (Klonopin) | <input type="checkbox"/> temazepam (Restoril) |
| <input type="checkbox"/> diazepam (Valium) | <input type="checkbox"/> triazolam (Halcion) |
| <input type="checkbox"/> flurazepam (Dalmane) | <input type="checkbox"/> buspirone (Buspar) |
| <input type="checkbox"/> zolpidem (Ambien) | <input type="checkbox"/> _____ |

ថ្នាំទាំងនេះធ្វើឲ្យធូរស្បើយនូវការកង្វល់ចិត្ត និងការរស់រវើកស្នេហាខ្លួន គឺវាធ្វើឲ្យជួរស្រាលក្នុងខ្លួន និងបានដេកលក់ និងបន្ថយរោគសញ្ញានៃការកង្វល់ចិត្ត។ ថ្នាំទាំងនេះគេយកប្រើសំរាប់ព្យាបាលការកង្វល់ចិត្ត និងរោគខ្វល់ចិត្ត ការរំជើបរំជួលចិត្ត រោគដេកមិនលក់ និងរោគញៀនសុរា។ បន្ថែមពីនេះ ថ្នាំទាំងនេះអាចនឹងជួយបំបាត់ការព្រួយចិត្ត ជម្ងឺព្រួយចិត្តគិតច្រើន និងនិយាយច្រើន រោគសញ្ញាអារម្មណ៍ Schizophrenia និងរោគផ្សេងទៀតដែលបញ្ចេញរោគសញ្ញាដូចគ្នានេះ។

មានជាទូទៅ	មិនសូវមាន	កម្រមាន
ការឈឺចាប់	ការរង្វេងវង្វាន់	ការភ្លេចភ្នំ
ស្រាលក្បាល	ឈឺក្បាល	ការរំជួលចិត្ត
សំដីគ្រឿង	ស្លុតមាត់	ការឆាប់ខឹង/ការរស់រវើក
វិលមុខ	ព្រិលភ្នែក	ចង្វាក់បេះដូងញាប់

ថ្នាំទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពរហ័សណាស់ លើកលែងតែថ្នាំ buspirone ចេញដែលធ្វើសកម្មភាពសន្សឹម។ ហើយវាត្រូវប្រើរយៈពេល១-២អាទិត្យក្នុងការបំបាត់ការកង្វល់បាន។

ថ្នាំនេះមិនត្រូវឈប់ប្រើវាត្រឹមតែម្តងទេ ពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យរើសាភាពរោគនេះឡើងវិញ ដូចជាការកង្វល់ ការដេកមិនសូវលក់ ការឆាប់ខឹង និងប្រកាច់។

ការលេបថ្នាំទាំងនេះជាមួយនឹងស្រាអាចបណ្តាលឲ្យដេកមិនលក់ ឬក៏សន្ទប់បាត់ស្មារតីផងក៏មាន។ មិនត្រូវផឹកស្រាជាមួយនឹងថ្នាំទាំងនេះទេ។

រាងកាយឬការរងរបួសអ្នកអាចនឹងញៀនពីផ្នែកតែទៅលើថ្នាំទាំងនេះ។ មានអ្នកជម្ងឺខ្លះត្រូវទទួលរងគ្រោះញៀននឹងថ្នាំទាំងនេះ ហើយត្រូវតែប្រើកំរិតវាកាន់តែច្រើនឡើងៗ។