

Alameda County Behavioral Health Care Services

藥物資料單：抗精神病劑 / antipsychotic agents

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> chlorpromazine (Thorazine) | <input type="checkbox"/> thioridazine (Mellaril) |
| <input type="checkbox"/> haloperidol (Hadol) | <input type="checkbox"/> trifluoperazine (Stelazine) |
| <input type="checkbox"/> fluphenazine (Prolixin) | <input type="checkbox"/> perphenazine (Trilafon) |
| <input type="checkbox"/> loxapine (Loxitane) | <input type="checkbox"/> thiothixene (Navane) |
| <input type="checkbox"/> olanzapine (Zyprexa) | <input type="checkbox"/> risperidone (Risperdal) |

抗精神病劑是用來治療頭腦不清、幻想聽到聲音、焦躁，以及與精神分裂症有關的恐懼感、兩極性情緒失調症、憂鬱，和其它病癥。此外，還能使頭腦清醒、思路清晰。

不同類型的抗精神病劑可能有不同的副作用。一些病人可能對某些藥劑的反應及承受力比一些較舊的藥劑更好些。就和其它藥物一樣，抗精神病劑會有一些副作用：

常見副作用

昏昏欲睡
口乾
肌肉僵硬
坐立不安
焦慮

不太常見副作用

皮膚對日光敏感
頭暈
發抖
性欲減弱
肌肉痙攣
月經失調

罕見副作用

中暑
全身性痙攣
皮膚變色
惡性神經分裂症
窒息

抗精神病劑可能會引致運動遲緩困難症 (T.D.)。該疾病會引致臉部及身體肌肉不能自控。這一副作用在部份病人身上可能是永久性，但是往往在一段時間後可以回復正常。您的醫生會幫您區別出運動遲緩困難症或是其它程度較輕的身體動作，如發抖、痙攣以及焦躁。

該藥必須每天服用，它是逐漸產生藥效。有時可能需要幾個星期或幾個月才能達到全部的藥效。