

## Alameda County Behavioral Health Care Services Drug Information Sheet: Antidepressants

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> fluoxetine (Prozac)<br><input type="checkbox"/> paroxetine (Paxil)<br><input type="checkbox"/> amitriptyline (Elavil)<br><input type="checkbox"/> clomipramine (Anafranil)<br><input type="checkbox"/> desipramine (Norpramin)<br><input type="checkbox"/> phenelzine (Nardil)<br><input type="checkbox"/> trazodone (Desyrel)<br>Other:----- | <input type="checkbox"/> sertraline (Zoloft)<br><input type="checkbox"/> protriptyline (Vivactil)<br><input type="checkbox"/> nortriptyline (Pamelor)<br><input type="checkbox"/> doxepin (Sinequan)<br><input type="checkbox"/> imipramine (Tofranil)<br><input type="checkbox"/> nefazodone (Serzone)<br><input type="checkbox"/> bupropion (Wellbutrin) |
|--|--|

داروهای ضد افسردگی برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار میگیرند، و می توانند روحیه، توانایی در تمرکز فکری، خواب، عادات غذایی و فعالیتهای بدنی را بهبود بخشند. علاوه بر این، این داروها برای ناراحتی هایی از قبیل دلواپسی ممکن است مفید باشند. آمار نشان میدهد که بین هشت یا نه نفر از هر ده بیمار مبتلا به افسردگی از طریق استفاده از داروهای ضد افسردگی موجود میتوانند مورد یاری قرار گیرند.

تمام گروه داروهای ضد افسردگی مؤثرند، گرچه بعضی از آنها ممکن است برای بیماران بخصوصی مؤثرتر واقع گردند. یعنی، یک گروه از این داروها مشخصاً برای یک بیمار بهتر کارگر هستند. و گروه دیگری از این داروها ممکن است برای بیمار دیگر مفید واقع شوند. باید متذکر شد که داروهای ضد افسردگی مثل هر داروی دیگر دارای عواقب ثانوی

است.

عادی	کمتر	نادر
یبوست	تیرگی بینایی	پریشانی
خواب آلودگی	سرآسیمگی/ نا آرامی	ضربان غیر عادی قلب
سرگیجه	اضافه وزن	نفس گرفتگی/ حمله ناگهانی عصبی
خشکی دهان	حساسیت پوستی به نور خورشید	رعشه
عصبی بودن/ التهاب	کم اشتها	لکنت زبان
سردرد	کم اشتیاقی به روابط جنسی	بی قراری
بی خوابی	حالت تهوع	

داروهای ضد افسردگی بتدریج مؤثر واقع می شوند و چندین هفته طول می کشد که به تأثیر کامل برسند، صبور باشید، زمان میخواهد که احساس بهتری کنید.

بخطرات داشته باشید، این داروها باید بطور مرتب مصرف شود تا اثر کارآمد داشته باشد