

Alameda County Behavioral Health Care Services Drug Information Sheet: Antipsychotic Agents

[] chlorpromazine (Thorazine)

[] haloperidol (Haldol)

[] fluphenzine (Prolixin)

[] Loxapine (Loxitane)

[] olanzapine (Zyprexa)

Other:-----

[] thioridazine (Mellaril)

[] trifluoperazine (Stelazine)

[] perphenzine (Trilafon)

[] thiothixene (Navance)

[] risperidone (Risperdal)

داروهای درمان روانی برای معالجه پریشانی، توهمات و خیالات، سرآسیمگی، ترس ناشی از جنون، دوگانگی رفتاری (افسردگی و هیجانات غیر عادی)، افسردگی و شرایط دیگر مصرف میشود. بعلاوه، این داروها میتوانند توانایی تفکر بیماران را منظم نمایند.

بعضی از داروهای درمان روانی دارای اثرات مختلف متقابل در مقایسه با بعضی دیگر از داروها دارند. بعضی از بیماران بشکل بهتری این داروها را تحمل کرده و جواب بهتری در مصرف این داروها میدهند. مثل هر داروی دیگری، داروهای درمان روانی دارای عواقب ثانوی هستند.

	کمتر	نادر
تیرگی بینایی	حساسیت پوست به نور خورشید	گرما زدگی
خواب آلودگی	سرگیجه	نفس گرفتگی (حمله ناگهانی عصبی)
خشکی دهان	رعشه	تغییر رنگ پوست
سفتی عضلات	کاهش نیروی جنسی	صرع مزمن
نا آرامی	گرفتگی عضلات	احساس خفگی
	ناراحتی های قاعدگی	

Tardive Dyskinesia (بی اختیاری حرکات عضله ها) حالتی است که ممکن است بوسیله صرع مزمن سبب شود. این بیماری باعث حرکات غیر اختیاری عضله ها می شود. در بعضی بیماران، ممکن است که این حالت دائمی باشد، اما معمولاً در طول زمان قابل تغییر و بهبود پیدا می کند. پزشک شما می تواند در تشخیص این بیماری و فرق آن با انواع دیگر حرکات عضله ها که چندان جدی نیستند مثل رعشه، گرفتگی عضلات و نا آرامی شما را کمک نماید. این داروها باید روزانه مصرف شوند و تأثیر آنها تدریجی است. ممکن است برای اثرات مفید این داروها زمان چند هفته و یا یک ماه لازم باشد.