

ALAMEDA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH CARE SERVICES

Hoja de información de fármacos: antidepresivos/antidepressants

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> fluoxetina (Prozac) | <input type="checkbox"/> sertralina (Zoloft) |
| <input type="checkbox"/> paroxetina (Paxil) | <input type="checkbox"/> protriptilina (Vivactil) |
| <input type="checkbox"/> amitriptilina (Elavil) | <input type="checkbox"/> nortriptilina (Pamelor) |
| <input type="checkbox"/> clomipramina (Anafranil) | <input type="checkbox"/> doxepina (Sinequan) |
| <input type="checkbox"/> desipramina (Norpramin) | <input type="checkbox"/> imipramina (Tofranil) |
| <input type="checkbox"/> fenelcina (Nardil) | <input type="checkbox"/> nefazodona (Serzone) |
| <input type="checkbox"/> trazodona (Desyrel) | <input type="checkbox"/> bupropión (Wellbutrin) |

Otro: _____

Los antidepresivos son sustancias que se utilizan en el tratamiento de la depresión y mejoran el estado de ánimo en general, la capacidad de concentración, los patrones de sueño y alimentación, y la actividad física. También pueden tener un efecto beneficioso en los casos de trastornos de ansiedad. Se ha calculado que ocho de cada nueve o diez pacientes depresivos pueden mejorar, tomando los medicamentos antidepresivos, disponibles en la actualidad.

Todas las clases de antidepresivos tienen efectos beneficiosos; pero algunas pueden ser mejores que otras, dependiendo del paciente; es decir, una clase de medicamento puede funcionar especialmente bien para una persona, mientras que otro individuo podría tener más éxito con un medicamento de otra clase. Tal como ocurre con cualquier medicamento, los antidepresivos tienen algunos efectos secundarios:

| Comunes | Menos comunes | Raros |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| estreñimiento | visión borrosa | desorientación |
| somnolencia | tensión/agitación | latidos cardíacos anormales |
| mareo, vértigo | aumento de peso | convulsiones |
| sequedad en la boca | sensibilidad cutánea al sol | temblores |
| ansiedad/nerviosismo* | disminución del apetito | habla acelerada |
| dolor de cabeza | menor impulso sexual | hiperactividad |
| insomnio* | náusea | |

Los medicamentos antidepresivos ejercen su efecto de una manera gradual, y pueden tomar varias semanas hasta alcanzar su efecto total. Tenga paciencia; transcurrirá cierto tiempo antes de que se sienta mejor.

Recuerde que debe tomar los medicamentos de manera regular para que puedan lograr su efecto total.